


RICHTLINIE <i>Kontrastmittel</i>	Salzburger Landeskliniken Universitätsinstitut für Radiologie der PMU Standort LKH	
Titel: Kontraindikationen jodhaltiger KM allgemein		Version: 06
Gültig für: alle MA		Gültig ab: 29.10.2018

Kontraindikationen für jodhaltige Kontrastmittel

- eingeschränkte Nierenfunktion
(siehe [Richtlinie KM-Gabe u. Nierenfunktionsparameter](#), [KM-Gabe und Metformin](#))
- Hyperthyreose
(siehe [Richtlinie KM-Gabe u. Schilddrüsenparameter](#))
- Jod- bzw. KM-Allergie
(siehe [Richtlinie Antiallergische Vorbereitung](#))
- Schilddrüsenkarzinom, toxisches Schilddrüsenadenom
(siehe [Richtlinie KM-Gabe u. Schilddrüsenparameter](#))
- vor Radiojodtherapie
- Plasmozytom (syn. multiples Myelom; Mb. Kahler) grundsätzlich lt. ESUR-Guidelines bei normaler Nierenfunktion keine Kontraindikation – ggf. Absprache mit dem Zuweiser empfohlen.
- Phäochromozytom: KI nur bei i.a.-Gabe ohne medikamentöser Vorbereitung
(siehe [Richtlinie KM-Gabe u. Phäochromozytom](#))

Erstellt von: Granitz	Datum: 23.10.2018	Unterschrift: (nur am Original)
Geprüft von: Lausmann	Datum: 25.10.2018	Unterschrift: (nur am Original)
Freigegeben von: Hergan	Datum: 29.10.2018	Unterschrift: (nur am Original)